



Dezynfekcja rąk wchodząc do domu pacjenta



**1**  
**Dezynfekcja tacy** zgodnie z lokalnymi zasadami tworzenia **Ogólnego Pola Aseptycznego**. Pozostawić do wyschnięcia



**2**  
**Stosowanie fartucha jednorazowego**



**3**  
**Skompletowanie sprzętu** i umieszczenie wokół tacy



**4**  
**Dezynfekcja rąk** ściereczką z alkoholem do rąk lub mydłem i wodą



**5**  
**Przygotowanie sprzętu** Ochrona **Kluczowych Punktów** za pomocą techniki bezdotykowej (NTT) i Mikro Pola Aseptycznego



**6**  
**Jednorazowy podkład** pod ramieniem pacjenta



**7**  
**Jednorazowa staza** badanie żył



**8**  
**Dezynfekcja rąk** alkoholową ściereczką do rąk lub mydłem i wodą



**9**  
**Założenie rękawic** (używaj sterylnych rękawic, jeśli **Kluczowe Punkty** muszą być dotykane bezpośrednio) i ponownie założenie stazy



**10**  
**Dezynfekcja skóry** z 2% CHG / 70% IPA stosując przecieranie przez 30 sekund. Pozostawienie do wyschnięcia



**11**  
**Nakłucie żyły** Ochrona **Kluczowych Punktów** i **Kluczowych Miejsc** korzystając z NTT. Jeśli konieczna jest ponowna ocena, powtórzyć krok 10 lub użyć sterylnych rękawic.

Jeśli próba pobieranie krwi nie powiodła się należy powrócić do kroku **7**



**12**  
**Utylizacja ostrych narzędzi** i sprzętu



**13**  
**Dezynfekcja tacy** zgodnie z lokalnymi protokołami



**14**  
**Utylizacja rękawic** fartucha i natychmiast...



**15**  
**Dezynfekcja rąk** ściereczką z alkoholem do rąk lub mydłem i wodą



**16**  
**Utylizacja odpadów** zgodnie z lokalnym protokołem



Opuszczając dom pacjenta dezynfekcja rąk

